

Biologicals. Het medicijn Etanercept

(Enbrel®)



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Inleiding

Etanercept is een medicijn dat de werking van Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF- α) beïnvloedt. TNF- α speelt een belangrijke rol in ontstekingsprocessen (zoals gewrichtsontsteking) bij verschillende reumatologische aandoeningen.

Hoe dit geneesmiddel wordt toegediend

Etanercept wordt een keer per week toegediend als injectie onder de huid.

De injectie wordt toegediend door u zelf.

Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt het zelf spuiten in de praktijk erg mee te vallen en goed aan te leren. U ontvangt instructies over de injectietechniek van de verpleegkundig specialist.

In uitzonderlijke gevallen kan iemand in uw omgeving de injecties toedienen. Wanneer u hulp van iemand anders krijgt bij het injecteren is het noodzakelijk dat deze persoon eveneens getraind is.

Soms ervaren patiënten een pijnlijk gevoel op de injectieplaats als de toegediende vloeistof niet op kamertemperatuur is.

Voor een minder pijnlijke injectie kunt u de voor gevulde spuit op kamertemperatuur laten komen (30 minuten buiten de koelkast) of enkele minuten voorzichtig in uw handen houden.

Let op: op geen enkele manier Etanercept opwarmen (bijvoorbeeld niet opwarmen in de magnetron of in warm water).

Moment van werking

U merkt waarschijnlijk niet meteen het effect van Etanercept. Dit kan een aantal weken duren.

U bespreekt op de polikliniek met uw behandelaar of het medicijn het gewenste effect heeft.

U heeft ongeveer drie tot vier maanden na het starten van de biological een eerste afspraak hierover op de polikliniek.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de behandelaar aan u heeft gegeven.

Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelaar of apotheker.

Specifieke bijwerking

Er kan een huidreactie in de vorm van roodheid, zwelling en/of jeuk optreden rond de plaats waar u de injectie heeft toegediend. Dit treedt vaak in de eerste maand na de start van de behandeling op en neemt meestal binnen 4 – 6 weken af.

Er zijn een aantal dingen die u hiertegen kunt doen:

1. Koelen van de injectieplek voorafgaand aan het prikken en na het injecteren;
2. Als koelen niet afdoende is, kunt u een uur voorafgaand aan de prik 1000 mg paracetamol innemen en dit zo nodig na 4 uur herhalen totdat de huidreactie is afgezaakt.

Let op: dit mag alleen als u nog geen paracetamol gebruikte. De maximaal toegestane dosering per dag is driemaal 1000 mg. Meldt dit wel aan uw behandelaar.

Meestal verdwijnen deze huidreacties na een paar weken. Mocht de reactie toenemen dan is het dringend advies om contact op te nemen met uw huisarts of behandelaar.



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (06-19) REU 502