

Pleurapunctie onder echogeleidinge



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Pleurapunctie onder echogeleide

Bij een pleurapunctie onder echogeleide wordt pleuravocht verkregen dat zich tussen uw longvliezen (pleurabladen) bevindt d.m.v. een dunne naald. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen pleuravocht wordt onderzocht in het Pathologisch Anatomisch laboratorium.

Wie voert de pleurapunctie uit?

De pleurapunctie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Uw voorbereiding op de pleurapunctie

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

De pleurapunctie

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te doen.

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Er wordt een warme gel op het te punteren gebied aangebracht. Vervolgens brengt de radioloog met het echoapparaat het gebied in beeld waaruit de punctie moet worden genomen. Hierna wordt de huid gedesinfecteerd.

Er wordt bij deze punctie geen verdoving gebruikt omdat het punteren van pleuravocht een eenmalige kleine prik is, die over het algemeen niet als heel pijnlijk wordt ervaren.

Vervolgens prikt de radioloog aan de rugzijde een dunne naald tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen (de pleuraholte) en zuigt het pleuravocht met een spuit op.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Zijn er risico's aan de pleurapunctie verbonden?

Een pleurapunctie kent weinig risico's of complicaties, soms kan een bloeding optreden. Langere opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicaties goed te behandelen.

Na de pleurapunctie

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de prikplaats. Daarna kunt u zich aankleden en naar huis gaan. Het is verstandig om na het onderzoek een uurtje rustig aan te doen.

Een pleurapunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Het is echter raadzaam om niet zelf te rijden, omdat u zich vanwege het onderzoek mogelijk niet zo fit voelt als u gewend bent.

Soms voelt de schouder wat pijnlijk aan. Dit gaat vanzelf weer over. Als dat nodig is kunt u een paracetamol (geen aspirine!) nemen.

Stagiaires

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire de radioloog assisteert, laat u ons dat dan gerust weten.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het pleurapunctie krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bijzonderheden

- Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
- Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
- Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder dit formulier wordt het onderzoek niet uitgevoerd.
- Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (01-19)RAD 448